

외국인 유학생 관리자 결핵 대응요령

◦ 대학교 보건관리자, 유학생담당자 ◦

결핵의 특징

- 의심증상** 뚜렷한 원인 없이 2-3주 이상 기침 등 호흡기 증상이 지속되고
발열, 야간발한(식은땀), 전신 무력감, 식욕부진, 의도치 않은 체중 감소가 동반될 수 있습니다.
- 감염경로** 전염성 결핵환자로부터 호흡기 분비물을 통해 감염됩니다.
- 전염기간** 전염성 결핵환자에서 증상 시작 최대 3개월 전부터 치료 시작 후 2주까지 전파가 가능합니다.
- 자연경과** 전염성 결핵환자 접촉자의 약 30%가 잠복결핵으로 감염되고 잠복결핵감염자 중
약 10%가 결핵으로 발병합니다. (5%는 감염 후 2년 이내, 나머지 5%는 평생에 걸쳐 나타남)

- 1 교내 결핵(의심)환자* 발생 시 지체 없이 **관할 보건소에 신고**하고 **보건소의 접촉자 조사**에 적극 협조
* 건강검진 결과 결핵환자나 결핵의심자로 통보받은 경우 또는 결핵으로 진단받거나 치료중임을 확인한 경우
- 2 기관 내 추가 결핵환자 발생과 유행 확산 최소화를 위하여
접촉자의 **결핵 검진 및 결핵예방 조치**에 적극 협조
- 3 전염성 결핵환자의 **등교 제한 조치** 협조
- 4 학내 보건실(의무실) 등을 통해 추가 의심환자 확인 시
보건소 신고 및 결핵검사 안내
- 5 추가 환자 발생 동향에 대해 **보건소와 정보 공유**
- 6 기숙사 입소(예정) 학생 대상 **연 1회(입소 시) 결핵검진** 권고
특히, **결핵고위험국가**에서 온 외국인 유학생은 결핵 검진 철저



✓ 결핵고위험국가

결핵환자가 인구 10만 명당 50명 이상이고
국내에서 취업, 유학 등 집단 활동을 하는 체류 자격 소지자가 많은 국가

(35개국)

네팔, 동티모르, 러시아, 말레이시아, 몽골, 미얀마, 방글라데시, 베트남, 스리랑카, 우즈베키스탄,
인도, 인도네시아, 중국, 캄보디아, 키르기스스탄, 태국, 파키스탄, 필리핀, 라오스, 카자흐스탄,
타지키스탄, 우크라이나, 아제르바이잔, 벨라루스, 몰도바공화국, 나이지리아, 남아프리카공화국,
에티오피아, 콩고민주공화국, 케냐, 모잠비크, 짐바브웨, 앙골라, 페루, 파푸아뉴기니



결핵ZERO
누리집 바로가기